


【护理学】

2019 军队文职真题



2019 年军队文职人员招聘考试
医学类—护理学试卷

第一部分 基础综合

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）

1.患者，女性，37 岁，反复出现左下腹疼痛，大便含大量粘液及血，结肠镜检查显示乙状结肠黏膜充血水肿，质脆，易出血。最可能的疾病是（ ）。


- A.克隆氏病
- B.溃疡性结肠炎
- C.细菌性痢疾
- D.乙状结肠癌

2.良好医患关系的基础应该是（ ）。

- A.上下级关系
- B.商业关系
- C.社会主义医德关系和法制关系
- D.亲戚关系

3.不与食管前方毗邻的结构是（ ）。

- A.右主支气管
- B.左主支气管



- C.气管、气管杈
- D.心包

4.患者，男性，67岁，长期反复咳大量脓痰。最可能的疾病诊断是（ ）。


- A.肺结核
- B.支气管扩张
- C.肺癌
- D.慢性支气管炎

5.针对传染病的预防措施，我们国家施行的制度是（ ）。

- A.预防保健制度
- B.有计划的预防接种制度
- C.爱国卫生运动
- D.有计划的卫生防疫

6.正常人无法获得主动免疫的接种物是（ ）。

- A.活疫苗
- B.灭活疫苗
- C.类毒素
- D.抗毒素



7.不会引起阻塞性黄疸的疾病是 ()。

- A.疟疾
- B.胆管癌
- C.胆道蛔虫症
- D.肝癌

8.属于联合关节的是 ()。

- A.胸锁关节
- B.肘关节
- C.膝关节
- D.椎间关节

9.属于甲类传染病的是 ()。

- A.霍乱
- B.AIDS
- C.SARS
- D.炭疽

10.维生素 B12 和叶酸缺乏引起的贫血是 ()。

- A.再生障碍性贫血
- B.缺铁性贫血
- C.巨幼红细胞性贫血
- D.β—型地中海贫血



11.肉芽肿性炎症最主要的特征性炎症细胞来源是()。

- A. 中性粒细胞
- B. 巨噬细胞
- C.淋巴细胞
- D.嗜酸性粒细胞


12.加强医德建设的目的是()。

- A. 保证医疗活动的正常进行
- B. 解决医疗卫生单位的矛盾
- C.实现医疗活动的道德本质
- D.防止市场经济对医疗活动的副作用

13.在中脑上、下丘之间切断脑干的动物，将出现的表现是()。

- A.骨骼肌明显松弛
- B.心跳停止
- C.呼吸停止
- D.去大脑僵直现象

14.给予患者进行药物治疗过程中，医生应该做的是()。



- A.开小处方，减轻病人负担
- B.确保用药合理
- C.联合用药，减轻毒副作用对患者的危害
- D.开大处方，增加病人负担

15.关于 oddi 括约肌的叙述，不正确的是（ ）。

- A.平时保持收缩状态，由肝分泌的胆汁，经肝左、右管、肝总管、胆囊管进入胆囊内贮存
- B.受神经体液因素调节
- C.进食后，oddi 括约肌收缩，保护胰腺
- D.肝胰壶腹周围有肝胰壶腹括约肌包绕

16.关于医师权利的叙述，不正确的是（ ）。

- A.医师的权利必须服从病人的权利
- B.医师具有一定的自主性
- C.医师权利的前提是履行自己的义务
- D.医师有特殊干涉权

17.可出现脉压增大的疾病是（ ）。

- A.主动脉瓣狭窄
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.心力衰竭
- D.缩窄性心包炎

18.成年人脊髓节段与椎骨的对应关系是 ()。

- A.脊髓下端对第 5 腰椎
- B.下颈部脊髓节段平同序数椎骨
- C.第 7 胸髓节对第 5 胸椎
- D.第 11 胸髓节对第 9 胸椎

19.冠状动脉粥样硬化最常受累的冠状动脉分支是 ()。

- A.右冠状动脉
- B.左冠状动脉主干
- C.左冠状动脉旋支
- D.左冠状动脉前降支

20.关于医疗模式的理解，不正确的是 ()。

- A.人们关于健康和疾病的基本观点
- B.医学临床实践活动与医学科研的指导思想、理论框架
- C.人们主观的理论概括
- D.与医学实践的发展水平相适应

二、单项选择题 (请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 1 分，共 20 分。)

21.关于窦房结叙述，正确的是 ()。

- A.位于心内膜深面

C. 为心脏的正常起搏点

C.与房室结无联系

D.没有自律性

22.属于腹膜外位的器官是 ()。

A.阑尾

B.肾脏

C.胆囊

D.升结肠

23.对光反射中，使瞳孔缩小的神经是 ()。

A.视神经

B.滑车神经

C.动眼神经

D.迷走神经

24.不属于面神经分支的神经是 ()。

A.颞支

B.鼓索

C.颊神经

D.下颌缘支

25.患者，男性，60岁，1年前出现静止性震颤，运动迟缓，步态障碍。引起该病的主要原



因是 ()。

- A. 皮层小脑损伤
- B. 中脑黑质病变
- C. 脑内多巴胺增多
- D. 大脑皮层病变

26. 关于脑膜炎球菌特性的描述，正确的是 ()。

- A. 属奈瑟菌属，革兰染色阳性
- B. 能产生毒力较强的外毒素
- C. 在脑脊液及瘀点涂片中，该菌多在中性粒细胞外，少数在细胞内
- D. 抵抗力弱，在体外能产生自溶酶而易于自溶

27. 心脏冠脉循环的特点是 ()。


- A. 血压高、流速快、血流量大、摄氧率高
- B. 血压高、流速快、血流量大、摄氧率低
- C. 血压低、流速慢、血流量小、摄氧率高
- D. 血压低、流速慢、血流量小、摄氧率低

28. 患者，男性，30岁，外伤后大出血，血压 65/40mmHg，其尿量明显减少的主要原因是 ()。

肾小球毛细血管压降低

- A. 血浆胶体渗透压增高
- C. 滤过膜通透性降低
- D. 肾小囊内压升高

哇哦



29.典型急性菌痢患者大便是（ ）。

A.米泔水样便 B.柏油样便 C.灰陶土样便 D.少量脓血便

30.下肢深静脉血栓脱落，易导致严重后果的并发症是（ ）。

A.肺栓塞 B.心肌梗死 C.脑梗死 D.肾梗死

31.最易引起肠道狭窄的疾病是（ ）。


A.肠阿米巴病
B.肠伤寒
C.肠结核
D.细菌性痢疾

32.患者，女性，75岁，行白内障手术，摘除并更换的是（ ）

A.晶状体
B.睫状体
C.玻璃体
D.角膜

33.不穿经腮腺的是（ ）。

A.面神经
B.颈内动脉
C.下颌后静脉
D.耳颞神经



34.不属于传染源的是()。

- A.显性感染
- B.隐性感染
- C.病原携带状态
- D.潜伏性感染

35.患者，男性，40岁，肾移植术后发生急性排斥反应，其主要病理特点是()。

- A.小动脉壁纤维素样坏死
- B.成纤维细胞和巨噬细胞增生引起小动脉内膜增厚
- C.小动脉内膜高度纤维化
- D.血管玻璃样变性

36.患者，女性，甲状腺癌术后出现声音嘶哑，可能损伤的神经是()

- A.喉返神经
- B.迷走神经
- C.舌咽神经
- D.下颌神经

37.患者，男性，61岁，大量饮酒后突发左上腹痛，疼痛呈持续性伴阵发性加重，向左腰背部放射，伴恶心呕吐。该患者可能是()。

- A.急性胆囊炎
- B.急性阑尾炎
- C.急性胰腺炎
- D.胃癌

38.患者，男性，65岁，心前区疼痛5小时，心电图示II、III、aVF导联出现异常Q波。最可能的诊断是()。

- A.前壁心肌梗死

- B. 下壁心肌梗死
- C. 正后壁心肌梗死
- D. 高侧壁心肌梗死

39.按照《母婴保健法》规定，可以申请医学技术鉴定的是（ ）。

- A.对婚前医学检查结果有异议的
- B.对婚前卫生征询有异议的
- C.对孕产期保健过程有异议的
- D.对医学指示意见有异议的


40.患者，女性，61岁，1年来常于餐后、睡觉前出现胸骨后烧灼样疼痛，口服奥美拉唑有效。最可能的诊断是（ ）。

- A.心绞痛
- B.胸膜炎
- C.胃食管反流
- D.胸骨骨折

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共20题，每题0.5分，共10分。）

41.根据需要层次理论，下列观点正确的是（ ）。



- A.不同层次需要会重叠出现
- B.各层次需要之间不会互相影响
- C.个体基本需要的满足程度与健康状况成正比
- D.个体满足心里需要的方式完全相同

42.护士小李在为患者进行药物注射时，未严格执行查对制度，最终用错药物致患者死亡。该护理行为的性质是（ ）。


- A.违反护理常规
- B.执行医嘱不严格
- C.违法行为
- D.过失犯罪

43.关于护患关系特征的描述，正确的是（ ）。

- A.是一种长久的人际关系
- B.是一种工作关系
- C.是一种求助关系
- D.是一种单向的人际关系

44.患者，女性，30岁，诊断为病毒性心肌炎1天。患者对自己所患疾病疑虑重重，多次询问护士，“我的病是怎么得的？我的病可以好吗？”该患者目前最主要的护理问题（ ）。

- A.知识缺乏
- B.活动无耐力
- C.疼痛
- D.体温过高



45.铺好的无菌盘有效期是()。

- A.4 小时
- B.8 小时
- C.12 小时
- D.24 小时

46.霍乱患者应实施的隔离是()。


- A.肠道隔离 B.严密隔离 C.呼吸道隔离 D.接触隔离

47.鼓励长期卧床的心衰患者做下肢踝泵运动，最主要的目的是()。

- A. 减少回心血量
- B.预防褥疮
- C.防止肌肉萎缩
- D.预防下肢静脉血栓形成

48.患者出现疼痛时，最常见的行为反应是()。

- A. 呼吸频率加快
- B.手心出汗
- C.肠胃功能紊乱
- D.皱眉、烦躁不安、呻吟



49.关于增进患者休息的护理措施，说法正确的是（ ）。

- A. 住院患者更换了休息环境，睡不着属正常现象，适应几天即可
- B.当患者主诉无法入睡时，应立即给予安眠药物
- C.生理上的舒适是获得良好休息的重要条件
- D.所有人的休息方式都是相同的

50.口腔真菌感染患者适用的口腔护理液是（ ）。


- A. 过氧化氢溶液
- B.醋酸溶液
- C.甲硝唑溶液
- D.碳酸氢钠溶液

51.具有降低血液粘稠度并改善微循环作用的药物是（ ）。

- A. 中分子右旋糖酐
- B.5%葡萄糖生理盐水
- C.白蛋白
- D.低分子右旋糖酐

52.患者，男性，36岁，诊断为心包积液。该患者可出现的特殊脉搏是（ ）。

- A.交替脉 B.水冲脉 C.洪脉 D.奇脉



53.患者，男性，12岁，行扁桃体摘除术，术后应用冷疗法最主要的目的是（ ）。

- A.降低体温
- B.减轻局部充血或出血
- C.控制炎症扩散
- D.减轻疼痛

54.患者，男性，野外作业时手背部被玻璃划伤，此时伤口处理正确的是（ ）。

- A.及时严密包扎伤口
- B.彻底清除伤口内异物
- C.伤口内积血可暂不清除
- D.禁止用3%的过氧化氢溶液冲洗伤口

55.患者，男性，38岁。胃溃疡病史4年，近3天出现黑色稀便，每日3~4次，患者主诉心慌。查体：面色苍白，贫血貌。目前主要的护理问题是（ ）。

- A.组织灌注量不足
- B.活动无耐力
- C.有水、电解质及酸碱平衡失调的危险
- D.有受伤的危险

56.糖尿病代谢性酸中毒患者的呼吸特点是（ ）。

- A.呼吸表浅且不规则
- B.呼吸深大且规则

C.呼吸由浅慢逐渐变为深快，然后再由深快转为浅慢

D.有规律地呼吸几次，突然停止呼吸，间隔一个较短时期后又开始呼吸

57.患者，男性，26岁，2周来反复呕吐、腹泻，近1周感乏力、头晕、手足麻木。查体：血压偏低，脉率86次/分，呼吸22次/分，血钠130mmol/L，血钾3.7mmol/L。该患者最可能的诊断是（ ）。

A.低钾血症

B.轻度低渗性脱水

C.中度低渗性脱水

D.代谢性酸中毒

58.疝修补术后管理，正确的是（ ）。

A.术后尿潴留不需要处理，会自行缓解

B.便秘只对术后有影响，术前无需特别处置

C.术后鼓励患者咳嗽，但要注意保护伤口

D.术后需绝对卧床48h，避免伤口裂开


59.T管护理与腹腔引流管护理最主要的不同点是（ ）。

A.保持引流管的通畅

B.更换引流袋时要无菌操作

C.观察引流量、颜色和性状

D.T管拔管前须试行夹管1~2天



60.下肢深静脉血栓形成最常见的临床表现是()。

- A.足背突然青肿 B.下肢突然肿胀 C.下肢突然疼痛 D.下肢浅静脉曲张

二、系列单项选择题(请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。共10题,每题1.5分,共15分。)

材料一:患者,男性,75岁,右侧肢体偏瘫。入院后护士发现患者骶尾部皮肤呈紫红色,面积为4cm×3cm,压之不褪色,触之较硬。第二天发现该处出现了直径3cm的水疱。

61.该患者的压疮分期是()。

- A. 炎性浸润期
B. 瘀血红润期
C. 坏死溃疡期
D. 深度溃疡期

62.关于水泡的处理方法,正确的是()。

- A.涂厚层滑石粉后包扎
B.剪去水泡表皮,用无菌纱布包扎
C.用无菌注射器抽出水泡内液体后,局部消毒包扎
D.减少皮肤摩擦,待水泡内液体自行吸收

63.护理措施正确的是()。

- A. 每天按摩骶尾部
- B. 每 8 小时翻身一次
- C. 保持床单位平整
- D. 给予低蛋白饮食

64. 此期的护理重点是 ()。

- A. 保护皮肤完整性，预防感染
- B. 促进局部血液循环
- C. 积极治疗原发病
- D. 清除腐肉，保护骨骼和肌肉


材料二：患者，男性，50 岁，患 2 型糖尿病 4 年，口服降糖药物控制不理想，需要加用胰岛素治疗。

65. 对该患者实施胰岛素治疗，正确的是 ()。

- A. 每天早餐后半小时内注射胰岛素
- B. 从大剂量开始，逐渐减量
- C. 血糖控制不稳时，每 3—4 天调整一次胰岛素剂量
- D. 开始胰岛素治疗后不需再控制饮食

66. 该患者在胰岛素使用过程中，最易出现的不良反应是 ()。

- A. 胃肠道反应



- B. 低血糖反应
- C. 过敏反应
- D. 注射区域脂肪增生

67. 该患者拟餐后快步走，此时，胰岛素注射的最佳部位是（ ）。

- A. 大腿前侧
- B. 上臂三角肌
- C. 腹部
- D. 股内侧


材料三：患者，男性，40岁，右胸部外伤致多根肋骨骨折。查体：呼吸困难、发绀，皮肤湿冷，血压 69/40mmHg，气管向左侧偏移，右胸廓饱满、呼吸音消失、叩诊呈鼓音。

68. 该患者目前最可能的诊断是（ ）。

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 心包积液

69. 该患者目前最主要的护理诊断/问题是（ ）。

- A. 清理呼吸道无效
- B. 气体交换受损



- C. 恐惧
- D. 低效型呼吸型态

70. 目前的首要急救措施是 ()。

- A. 排气减压
- B. 心理护理
- C. 快速补液
- D. 呼吸机辅助呼吸

三、多项选择题 (请根据题目要求, 在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案, 错选或多选均不得分, 少选且选择正确的每个选项得 0.3 分。共 10 题, 每题 1.5 分, 共 15 分。)

71. 关于执行医嘱的叙述, 正确的有 ()。

- A. 护士应对医嘱仔细核查, 确定无误后方可执行
- B. 患者病情发生变化时, 护士应及时停止医嘱
- C. 医生不方便开具书面医嘱时, 护士应执行口头医嘱
- D. 对于不清楚、不完整的医嘱, 护士应核实后再执行
- E. 患者对医嘱提出疑问时, 护士应核实医嘱的准确性

72. 为增进患者睡眠, 可采取的措施有 ()。

- A. 减轻心理压力
- B. 合理使用药物
- C. 睡前饮用热咖啡
- D. 创造良好睡眠环境

E.睡前进行体育锻炼

73. “无尿”的正确解释包括()。

A.24 小时尿量少于 50ml

B.24 小时尿量少于 100ml

C.4 小时内无尿

D.8 小时内无尿

E.12 小时内无尿

74.患者，男性，28 岁，诊断为肺结核。下列护理措施正确的有()。

A. 饮水量每日不宜超过 1000ml

B.标准化疗方案应持续 6~9 个月

C.给予高热量、高维生素、高蛋白饮食

D.如出现咯血，首选垂体后叶加压素治疗 E.鼓励患者轻咳，不要屏气

75.患者，女性，62 岁，高血压 1 年，给予用药指导，正确的有()。


A.遵医嘱按时按量服药

B.强调长期药物治疗的重要性

C.注意控制饮水

D.血压控制满意后，试行减少药量

E.定期监测血压



76.糖尿病患者预防感染，可以采取的措施包括（ ）。

- A. 皮肤有破损立即就医
- B. 保持外阴清洁
- C. 保持良好的个人卫生
- D. 长期服用抗生素
- E. 保持良好的足部卫生


77.严重低钾血症的临床表现包括（ ）。

- A. 恶心、呕吐
- B. 口周及手足麻木
- C. 肠鸣音亢进
- D. 腱反射减弱，甚至消失
- E. 腹胀

78.关于肠内营养的描述，正确的有（ ）。

- A. 肠内营养符合生理需要，并发症少
- B. 昏迷病人不能使用肠内营养
- C. 营养液输入速度不用特别控制
- D. 营养液的温度应接近体温
- E. 只要肠道有功能，尽量采取肠内营养

79.对诊断不明的腹部闭合性损伤患者适用的护理措施有（ ）。



- A.禁食
- B.静脉补液
- C.及时镇痛
- D.严密观察病情
- E.鼓励患者活动

80.肠梗阻的非手术治疗措施有 ()。

- A.禁食
- B.纠正水电解质和酸碱失衡
- C.胃肠减压
- D.按摩腹部
- E.局部热敷

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，错选或多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.4 分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

材料四：患者，女性，70 岁，细菌性痢疾 3 天，收入传染科住院治疗。

81.护士小王在为病人实施护理操作时，发现病人的手表掉落在地上。小王用避污纸捡起手表，正确做法包括 ()。

- A.污染的手可直接掀页撕取避污纸
- B.从避污纸的正页面抓取纸张
- C.避污纸使用后应弃于污物桶内
- D.使用后的避污纸应集中焚烧处理
- E.清洁的手不可直接接触避污纸

82.该患者痊愈出院后，进行终末消毒处理，做法正确的有（ ）。

- A. 病室用 1%过氧乙酸溶液熏蒸
- B. 血压计及听诊器用微波消毒
- C. 病房地面用 2000mg/L 含氯消毒剂喷洒
- D. 病床及桌椅用 0.2%过氧乙酸溶液擦拭
- E. 被服类消毒后，送洗衣房清洗

材料五：患者，男性，53 岁，肝硬化病史 5 年。近 2 周因食欲不振、腹胀、尿少、下肢水肿，以“肝硬化失代偿期”收治入院。身体评估：腹部膨隆呈蛙状，移动性浊音（+）。

83.该患者出现腹水的主要机制包括（ ）。

- A. 门静脉压力增高
- B. 低清蛋白血症
- C. 肝淋巴液生成过多
- D. 抗利尿激素分泌增多
- E. 雌激素分泌增多

84.针对该患者的护理措施，正确的有（ ）。

- A. 给予半卧位
- B. 定期测量体重
- C. 给予低钾食物
- D. 避免骤然增加腹压的动作
- E. 放腹水后应密切观察

85.该患者的饮食指导原则包括 ()。

- A.高热量
- B.高蛋白
- C.高维生素
- D.高脂肪
- E.低钠

材料六：患者，女性，70岁，风湿性心瓣膜病26年。高血压病15年，阵发性房颤10年，今日突发意识模糊，左侧肢体出现严重感觉障碍和运动功能丧失，伴偏盲、失语。心率120次/分、脉搏96次/分、呼吸24次/分，血压180/110mmHg。

86.该患者目前存在的护理诊断问题有 ()，

- A.生活自理能力缺陷
- B.躯体移动障碍
- C.潜在并发症、脑水肿
- D.语言沟通障碍
- E.有皮肤受损的危险

87.护理措施正确的有 ()。

- A.保持肢体功能位
- B.头部用冰袋冷敷
- C.用热水袋为患者取暖
- D.监测生命体征
- E.溶栓时观察皮肤黏膜是有无出血

材料七：患者女性，42岁，高处跌落后腰部着地双下肢不能活动，腹股沟以下皮肤感觉消失，大小便失禁，诊断为脊髓圆锥损伤急诊入院。

88. 紧急救治的措施包括（ ）

- A.建立静脉通道，保持有效循环血量
- B.保持气道通畅和有效通气
- C.双下肢固定并局部制动
- D.留置导尿
- E.立刻采用抗感染治疗





下载犀鸟公考APP



关注微信公众号
明星周边送不停

犀鸟教育出品
让中国大学生更具竞争力