


# 【护理学】

## 2018 军队文职真题



2018 年军队文职人员招聘考试  
医学类—护理学试卷

第一部分 基础综合

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）

1. 可以使大腿后伸的肌肉是（ ）

- A. 臀大肌
- B. 臀中肌
- C. 梨状肌
- D. 阔筋膜张肌

2. 关于奇静脉的叙述，正确的是（ ）

- A. 注入头臂静脉
- B. 注入上腔静脉
- C. 起自左腰升静脉
- D. 收集胸廓内静脉的血液

3. 汇入胸导管的淋巴来源于（ ）

- A. 左上半身的淋巴
- B. 右下半身的淋巴
- C. 右上半身的淋巴
- D. 左下半身的淋巴

4. 兴奋在神经+肌肉接头传导时，乙酰胆碱递质与受体结合引发的终板电位变化是（ ）



- A. 对  $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$  通透性增加，发生超极化
- B. 对  $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$  通透性增加，发生去极化
- C. 仅对  $\text{K}^+$  通透性增加，发生超极化
- D. 仅对  $\text{Ca}^+$  通透性增加，发生去极化

5. 压缩性骨折最常发生于 ( )

- A. 腓骨头
- B. 股骨头
- C. 椎体
- D. 腕舟状骨


6. 某疟疾患者突然畏寒、寒战，体温  $39^{\circ}\text{C}$ ，此时体温的变化是由于 ( )

- A. 散热中枢兴奋
- B. 产热中枢兴奋
- C. 体温调节功能障碍
- D. 调定点上调

7. 属于病理性肥大的是 ( )

- A. 妊娠期子宫肥大
- B. 长期体力劳动者的心室肥大
- C. 高血压引起的心肌肥大
- D. 运动员肌肉肥大

8. 大量细菌毒素入血，引起全身中毒症状，但血培养阴性者成为 ( )



- A.菌血症
- B.病毒血症
- C.毒血症
- D.败血症

9.慢性炎症灶内最常见的炎细胞是（ ）

- A.中性粒细胞
- B.淋巴细胞
- C.嗜酸性粒细胞
- D.多核巨细胞


10.病变或其进一步发展与肉芽组织无关的是（ ）

- A. 十二指肠溃疡
- B.血肿
- C.静脉石
- D.肝脓肿

11.含有三个胚层组织成分的生殖细胞肿瘤称为（ ）

- A.间叶瘤
- B.错构瘤
- C.畸胎瘤
- D.炎性假瘤

12.急性感染性心内膜炎的瓣膜赘生物中不具有的成分是（ ）



- A. 大量中性细胞
- B.大量细菌菌落
- C.纤维蛋白
- D.大量肉芽组织

13.在采集病史时，避免使用医学术语提问，下列选项不正确的是（ ）

- A. 你是否有过过敏性鼻炎
- B. 你是否有过鼻痒、打喷嚏
- C. 你是否有过咳嗽、咳痰
- D. 你是否有过头晕、头疼


14.患者、男性、19岁，突发脐周疼痛，呈进行性加重并逐渐转至右下腹，伴恶心、呕吐，右下腹局部压痛。最有可能诊断是（ ）

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆囊炎
- C.胆结石
- D.急性胃穿孔

15.患者严重代谢性酸中毒，常出现的呼吸类型为（ ）

- A. 间停呼吸
- B. Cheyne-Stokes 呼吸
- C. Bioys 呼吸
- D. Kussmaul 呼吸

16.患者有明显双下肢水肿伴胸腹水表现，可排除的疾病是（ ）



- A. 晚期肝硬化
- B. 布加氏综合征
- C. 肾病综合征
- D. 席汗综合征

17. 引起肺动脉瓣区第二心音增强的疾病是 ( )

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 肺动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 高血压


18. 一般采用 ( ) 检查直肠膀胱窝及盆腔内脏器。

- A. 截石位
- B. 右侧卧位
- C. 肘膝位
- D. 左侧卧位

19. 心律失常最致命的是 ( )

- A. 多源性频发室性早搏
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 心室颤动

20. 患者，男性，35岁，从海南旅游回家不久突起剧烈腹泻，水样便，每10分钟至半小时1次，量多，经医院诊断为霍乱。查体：腹部叩诊呈鼓音，腱反射消失，心电图Q-T时限延长，并出现U波，根据查体和心电图检查可诊断为 ( )



- A.低血钠
- B.高血钾
- C.高血钠
- D.低血钾

二、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）

21.周围型肺癌的发生部位是（ ）

- A.支气管
- B.肺叶支气管
- C.段支气管以下
- D.支气管树

22.关于睾丸的描述正确的是（ ）

- A. 外形似蚕豆
- B.内侧邻接附睾
- C.睾丸间质是产生精子的部位
- D.后缘有血管、神经和淋巴管出入

23.沙眼易发生在（ ）

- A. 球结膜
- B. 角膜
- C.睑结膜
- D.眼睑



24.关于突触传递的描述，错误的是（ ）

- A. 具有延搁效应
- B. 易疲劳
- C. 双向性
- D. 通过递质传递信号

25.患者，男性，20岁，贫血30年，伴有下肢慢性溃疡，化验为正细胞贫血，血清铁460ug/L，总铁结合力210ug/L，骨髓铁（++），应诊断为（ ）


- A. 再生障碍性贫血
- B. 慢性感染性贫血
- C. 营养性巨幼细胞性贫血
- D. 缺铁性贫血

26.成年人中心静脉压的正常值是（ ）

- A. 5-12mmHg
- B. 5-12cmHg
- C. 5-12mmHg
- D. 5-12Kpa

27.下列为含有B族维生素的辅酶，例外的是（ ）

- A. 磷酸吡哆醛
- B. 辅酶A
- C. 细胞色素C
- D. 四氢叶酸





28.患者，男性，10岁，3天前受凉后突然寒战，高热，咳嗽，气促，胸片右上大片实变影，血气分析， $pH7.46$ ， $PaCO_231mmHg$ ， $BE0.4mmol/l$ ， $SB22mmol/L$ ， $PaO_2mmHg66mmHg$ ，应诊断为（ ）

- A.呼吸性酸中毒
- B.代谢性碱中毒
- C.呼吸性碱中毒+代谢性酸中毒
- D.呼吸性碱中毒

29.糖皮质激素的作用广泛而复杂，叙述正确的是（ ）


- A. 促进葡萄糖的利用
- B.促进脂肪的分解
- C.促进肌肉组织蛋白质分解
- D.减少红细胞和淋巴细胞的数目

30.常发生细胞水肿的器官是（ ）

- A. 胃、肝、脾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、肠、胃
- D. 胃、肾、肝

31.下列器官发生梗死时对集体的影响较小的是（ ）

- A.心
- B.脑
- C.肾



D.肠

32.B 型慢性萎缩性胃炎好发于 ( )

- A. 贲门部
- B. 胃底
- C.胃体
- D.胃窦

33.患者，男性，36 岁，肝硬化腹水，尿少，四肢浮肿，心率 125 次/分，呼吸 40 次/分，端坐，有脐疝，治疗中首选 ( )


- A.西地兰静注
- B.双氢克尿噻口服
- C.放腹水
- D.口服甘露醇

34.患者，男性，35 岁，病程 2 个月，轻度乏力，腹胀，皮肤瘙痒，粪便颜色变浅。肝肋下触 50px，梗阻性黄疸化验结果，肝胆 B 超未见肿瘤、结石，肝外胆管无扩张，应诊断为 ( )

- A.梗阻性黄疸 B.胆汁性肝硬化
- C.慢性活动性肝炎 D.淤胆型肝炎

35.关于霍奇金淋巴瘤的叙述，不正确的是 ( )

- A.肿瘤原发与淋巴结
- B.肿瘤细胞为 R-S 细胞



C.病变组织中有各种炎细胞存在

D.病变后期可发生白血病转化

36.患者，男性，18岁，活动时突感右胸部撕裂样痛，查体：大汗淋漓惊恐状，气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。最可能的诊断是（ ）

A. 胸腔积液

B. 大叶性肺炎

C.干性胸膜炎

D.右侧张力性气胸

37.患者，男性，一个月前因外伤手术输血 800ml，近一周出现乏力，食欲不振，尿色加深，化验肝功 500U/L，抗 HCV（+），HCV PCR（+），抗 HBc（+），诊断应考虑（ ）

A.急性丙型肝炎

B.慢性丙型肝炎

C.乙、丙型肝炎病毒合并感染

D.急性乙、丙型肝炎

38.生命价值论是（ ）统一的理论。


A. 美德论与义务论

B.生命神圣与人道论

C.生命质量与生命价值

D.生命神圣与生命价值

39.关于医术与医德之间关系的理解，不正确的是（ ）



- A. “医乃仁术”
- B.有能力做的就应该去做
- C. “大医精诚”
- D.临床医学决策同时也是伦理决策

40.根据传染病防治法，应按甲类传染病管理的是（ ）

- A. 传染性非典型肺炎
- B.肺炭疽
- C.艾滋病
- D.鼠疫

## 第二部分 专业知识


一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 0.5 分，共 10 分。）

41.病人床上洗发过程中，突然出现面色苍白、出冷汗，应该立即

- A. 通知医生
- B.停止操作
- C.加快动作完成洗发
- D.鼓励患者坚持片刻

42.病人类风湿性关节炎入院，医嘱阿司匹林口服，护士在指导患者饭后服用阿司匹林的目的

- A.提高药物疗效
- B.减轻对胃肠道的刺激
- C.降低药物毒性
- D.减少对肝脏的损害



43.患者呼吸有浅慢到深快到浅慢，暂停 30s，周而复始，这个呼吸叫做

A.间停呼吸 B.潮式呼吸 C.叹息样呼吸 D.库斯呼吸

44. 对于上消化道出血，（ 血压很低 ）患者应该立即

A.紧急胃镜检查以明确诊断

B.建立静脉通路

C.立即转送上级医院

D.去甲肾上腺素胃内滴注

45. 高血压病，为其测量血压时正确的做法是

A.缓慢放气，速度 4mmHg/s

B.听到第一声响即为舒张压

C.若采取立位测量，手臂应平第六肋间

D.放气时听到的最强音即为收缩压

46. 慢性胃炎病人健康教育，哪项正确

A.只要好了，就可以随便吃

B.可以进食辛辣食物


C.硫糖铝应在餐后服用

D.定时定量进食，细嚼慢咽

47. 肝性脑病前驱期的表现

A.性格和行为失常

B.昏睡



- C.扑翼样震颤
- D.脑电图异常

48. 皮下注射普通胰岛素起效时间

- A.0.5~1h
- B.2~3h
- C.立即起效
- D.20~30min

49. 以下不属于休克早期的表现

- A.脉搏细速
- B.面色苍白、发绀
- C.血压下降
- D.尿量减少

50. 病人输入库存血会引起那种电解质紊乱

- A.低血钾
- B.高血钾
- C.高血钠
- D.低血钙

51. 病人车祸导致闭合性腹部损伤，护士判断有无空腔脏器损伤的依据

- A.腹部压痛



- B.腹膜刺激征
- C.腹部损伤程度
- D.腹部外部特征

52. 患者被铁钉扎伤，送入医院应该，为了预防破伤风应该

- A.注射大剂量抗生素
- B.注射破伤风抗毒素
- C.注射破伤风类毒素
- D.注射大剂量青霉素

53. 嵌顿性肠梗阻和绞窄性肠梗阻最主要的区别


- A.肠内容物有无血液循环障碍
- B.肠管壁有无运血障碍
- C.梗阻的严重程度不同
- D.梗阻的时间

54. 患者手术后 4 日，发热，伤口处红肿，考虑患者出现了

- A.切口感染
- B.外科手术吸收热
- C.切口裂开
- D.切口内有血肿

55. 护士获取资料的来源

- A. 阅读病历及健康记录



B.病人家属的陈述

C.观察及体检获取

D.阅读病例及健康资料

56. 下肢静脉曲张患者鼓励病人下床活动的目的

A.避免深静脉血栓形成

B.避免皮肤压疮

C.避免下肢肌肉萎缩

D.避免泌尿系统感染

57. 骨折现场急救,错误的是

A. 开放性骨折应现场复位

B.取清洁布类包扎伤口

C.就地取材,固定伤肢

D.平托法搬移脊柱骨折病人

58. 颅中窝骨折脑脊液耳漏时,禁忌外耳道堵塞和冲洗的目的是

A.预防颅内水肿

B.避免脑疝形成


C.减少脑脊液外漏

D.预防颅内感染

59. 患者脑梗塞导致右侧瘫痪,护士在测血压时,应测

A.左侧上肢

B.左侧下肢





- C.右侧上肢
- D.右侧下肢

60. 心脏复苏首选药物

- A.肾上腺素
- B.异丙肾上腺素
- C.利多卡因
- D.糖皮质激素

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

(61 ~ 63 共用题干)


患者女性，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房

61. 病房护士应为患者安置的体位是

- A. 仰卧屈膝位 6 小时
- B. 去枕平卧 6 小时
- C.侧卧位 6 小时
- D.中凹卧位 6 小时

62.术后第二天患者体温 38.2℃，并诉切口疼痛，此时护士应为患者安置的体位是

- A. 头高足低位
- B. 仰卧屈膝位
- C. 半坐卧位



D.端坐位

63.安置该体位的目的是

- A.可减少局部出血，利于切口愈合
- B.有利于增进食欲，为进食作准备
- C.有利于减少回心血量，减轻心脏负担
- D.可使感染局限，减轻切口缝合处的张力，缓解疼痛

(64 ~ 66 共用题干)

患者突然突然晕倒，考虑出现心搏骤停

64. 判断心搏骤停的依据


- A.心音消失 B.呼吸断续
- C.大动脉搏动消失 D.面色苍白

65.此时应做如何处置

- A.立即给心肺复苏加电除颤
- B.冰袋降温，严密监测生命体征的变化
- C.建立 2 条静脉通路，进行快速给药
- D.开胸，及早进行胸内心脏按压

66.复苏的有效指征

- A.神经反射不明显
- B.上肢收缩压在 8kPa(60mmHg)以上
- C.可触及大动脉搏动 D.瞳孔由小变大



(67 ~ 68 共用题干)

患者车祸损伤，大出血，血压 75/60mmHg,心率 100 次/分，皮肤出现瘀点瘀斑

67.对于此病人的护理措施

- A.保持呼吸道通畅
- B.立即建立静脉通路积极补充血容量
- C.应用血管收缩剂
- D.纠正酸中毒

68.此时，病人处于休克哪一时期

- A.休克早期
- B.休克失代偿期
- C.休克晚期
- D.未发生休克

(69 ~ 70 共用题干)


患者损伤胸壁，严重呼吸困难，皮下气肿，伤口处有嘶嘶声

69.首要的护理问题

- A.营养失调
- B.有感染的危险
- C.呼吸形态改变
- D.活动无耐力

70. 护士应采取的急救措施

- A.心肺复苏
- B.用油纱布按压封闭伤口



C.解除窒息


D.控制出血

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，错选或多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.3 分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

71-80. ( 缺 )

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，错选或多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.4 分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

81-90. ( 缺 )





下载犀鸟公考APP



关注微信公众号  
明星周边送不停

犀鸟教育出品  
让中国大学生更具竞争力